

كيفية العناية بطفلك المصاب بخراج

ستزودك هذه النشرة بمعلومات عن أسباب الإصابة بالخراج وأعراضه وتشخيصه وعلاجه ونصائح الرعاية في المنزل.



ما هو الخراج؟

الخراج هو تجمع للصدید (سائل ملوث) يتكون تحت جلد طفلك.

ما هي أسباب الخراج؟

يحدث الخراج بسبب أنواع متعددة من البكتيريا والفطريات. في بعض الأحيان، يحدث بسبب وجود جسم غريب (شظية أو قطعة زجاج وما إلى ذلك). استجابة لهذه الجراثيم/الأجسام الغريبة، ينشط الجهاز المناعي (نظام الجسم الدفاعي) ويرسل كرات الدم البيضاء لمحاربة تلك الجراثيم أو الأجسام الغريبة. وفي النهاية، تُكوّن الخلايا البيضاء مع البقايا الأجسام الأخرى تجمّعًا من الصدید.

ما هي أعراض الخراج؟

يمكن أن يتكون الخراج فوق الجلد وتحتّه وحول الأسنان وداخل الجسم. على الجلد، يبدأ ظهوره عادة في صورة نتوءات حمراء صغيرة تزداد حجمًا وتمتلئ بالصدید. في بعض الحالات، تنفتح هذه النتوءات تلقائيًا وتُخرج الصدید.

كيف يتم تشخيص الخراج؟

يمكن أن يشخص طبيب طفلك الخراج بالنظر إلى المنطقة المصابة ولمسها. في بعض الحالات، قد يطلب الطبيب إجراء فحص مثل الموجات فوق الصوتية لتقييم عمق وحجم الخراج.

كيف يُعالج الخراج؟

- 1- كمادات دافئة عدة مرات في اليوم في المنزل إن كان الخراج صغيرًا
- 2- شق الخراج ليتمكن كافة الصّديد من الخروج في المستشفى
- 3- في بعض الأحيان قد تكون المضادات الحيوية عن طريق الفم مطلوبة عند ظهور احمرار وتورم في المنطقة المحيطة بالخراج.

نصائح العناية في المنزل

- 1- حافظ على الجرح جافًا ونظيفًا
- 2- اغسل اليدين قبل وبعد لمس المنطقة المصابة
- 3- تجنب عصر وخدش المنطقة المصابة
- 4- تأكد من إكمال طفلك لدورة العلاج بالمضادات الحيوية إن وصفت له

اطلب المشورة الطبية إذا:

- 1- زاد حجم الخراج بالرغم من استعمال الكمادات الدافئة
- 2- عاد الخراج للظهور بعد - معالجته
- 3- لم يلتئم الجرح في غضون أيام قليلة بعد الشق والتصريف

اذهب إلى قسم الطوارئ إذا ظهرت الأعراض التالية على طفلك:

- 1- الحمى بالرغم من تناول العلاج
- 2- زيادة التورم والاحمرار حول المنطقة المصابة
- 3- زيادة الإفرازات من موضع - الخراج
- 4- تحول البول للون الغامق مثل لون الكوكا كولا
- 5- تورم حول العينين والأعضاء التناسلية
- 6- فقدان الشهية والقيء